

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U001290

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-05-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Туркевич Марта Олександрівна

2. Turkevych Marta

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 14.03.02

Назва наукової спеціальності: Патологічна анатомія

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 24-04-2019

Спеціальність за освітою: 7.12010001

Місце роботи здобувача: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.600.03

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: 79010, м. Львів, вул. Пекарська 69

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 76.03.49

Тема дисертації:

1. Ефективність колагеногенезу шкіри при введенні імплантатів різної природи (експериментально-патоморфологічне дослідження)
2. Efficiency of collagenogenesis of a skin at introduction of implants of various nature (experimental-pathomorphological research)

Реферат:

1. Дослідження шкіри в нормі та при введенні імплантатів різної структури та хімічного складу проводилось із використанням загальногістологічних, гістохімічних, імуногістохімічних та морфометричних методів. Показано позитивний вплив при введенні імплантатів на морфофункціональні особливості шкіри. При дослідженні морфологічних змін в періімплантній зоні виявлено, що у всіх групах піддослідних щурів на різних хронологічних етапах утворюється колаген з різним терміном біодеградації та у різних кількостях. При дослідженні колагеногенезу в періімплантній зоні виявлено, що у всіх групах піддослідних щурів на 14-й день дослідження визначалась велика кількість активних фібробластів. Починаючи з 30-го дня відбувалось формування грубих колагенових пучків, кількість яких залишалась стабільно високою протягом 90, 180 та 365 днів, а вже станом на 540-й день визначались сформовані стратифіковані пучки в меншій кількості, ніж на

попередніх етапах (нитка LLT), що свідчило про різні терміни біодеградації колагену I та III типів. Встановлено, що в залежності від типу імплантаційної нитки (її хімічний склад та структура) колагеногенез стимулюється неоднаково. На інтенсивність колагеноутворення в значній мірі впливає ступінь травматизації тканин, пов'язаний з рельєфністю та формою нитки, а також наявність у їх складі полімолочної кислоти. Саме тому найбільш ефективний колагеногенез спостерігався при використанні косметичних ниток, що мали форму пружинки або ниток з насічками у поєднанні з полімолочною кислотою (EV, LLS, NS). Особливої уваги заслуговує перманентна поліпропіленова нитка-пружинка AS, що хоч і не має в своєму складі полімолочної кислоти, але за рахунок своєї структури стимулює інтенсивний колагеногенез. Станом на 540-й день експерименту жодна із резорбуючих ниток не деградувала повністю, що вкладається в рамки інформації, наданої виробником про час розпаду не менше 365 днів, та доцільність використання даних косметичних ниток в естетичній дерматології з метою тривалої ліфтингової корекції шкіри. При постановці імуногістохімічних реакцій виявлено, що якісний складу колагену у більшості груп (LLS, LLT, NS, AS) піддослідних включав I та III типи, однак у різному відсотковому співвідношенні. Найбільш інтенсивний колагеногенез спостерігався при застосуванні нитки EV, при імплантації якої утворився виключно колаген I типу, що свідчить про його довготривалий ефект стимуляції та тривалий час біодеградації; колаген III типу - відсутній. Імплантаційна нитка NS виявилась менш ефективною, щодо стимуляції вироблення колагену I типу. Колагенізація в ділянці дослідження нитки LLS спостерігалась у всіх тварин впродовж усього періоду. Інтенсивність її коливалась від максимального показника на 30 день до мінімального на 540-й день. Морфометричний аналіз критеріїв ефективності колагеногенезу виявив, що за показниками товщини колагенової муфти, щільності її шарів та щільності колагену I типу в тканинах наближених до муфти, найвищі значення спостерігаються при застосуванні серії LLS, на другому місці за сукупністю трьох показників знаходяться матеріали серії NS та EV.

2. Nowadays, in Ukraine, widespread application of two main methods of correction of age-related skin changes has been found: treadlifting with polydioxanone and Aptos threads in various modifications. The verbal translation of the English word "thread lifting" means "thread tightening". However, the term "treadlifting" is not new and involves a non-invasive surgical lifting of the face using special threads with microspheres/cones/teeth. The described method is also well-known and recognized throughout the world. However, despite a significant number of non-invasive interventions of this type, the issue of the effectiveness of collagenogenesis as a leading and prognostically meaningful criterion for the quality of the provision of this range of services was not studied either in Ukraine or in the world as a whole: - not determined the intensity of regenerative-inflammatory changes in the skin when using different types of implants; - the effectiveness of collagenogenesis, its qualitative and quantitative composition in the structure of the connective tissue formed in the implantation zones and around the place of "injury" was not investigated; - duration of implant persistence (except for data specified by the manufacturer) as a significant criterion of efficiency and expediency of their use is not studied. The purpose of the work was to establish the qualitative and quantitative composition of collagen, which is formed at the place of introduction of resorbing and permanent implants on the basis of the study of pathomorphological changes in the skin. The tasks of the work concerned the study of morphological changes in the area of implantation of threads - the fact of collagen formation at various chronological stages; determination of qualitative composition of collagen formed in peri-implant zones; establishing the relationship between the type of implantation thread and the intensity of collagenogenesis; definition of the terms of degradation of investigated resorbing implants in the skin of the experimental rats; determination of the presence and qualitative composition of inflammatory infiltration in peri-implant sites. The object of the study was peri-implant skin zone of white rats. The subject of the study was pathomorphological changes (particularly, collagenogenesis) in the places where implants were introduced. The studies were conducted on 310 sexually mature white male rats of the Vistar line weighing 100-130 g. All animals were kept under vivarium of Danylo Halytsky Lviv National Medical University, experiments were conducted in accordance with the provisions of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used in experimental and other scientific purposes (Strasbourg, 1986), Council of Europe Directive 86/609 / EEC (1986), Law of Ukraine No. 3445-IV "Protection of Animals from Cruel Treatment". Animals were withdrawn from the

experiment by overdose of etheric anesthesia (exposure 5-7 minutes). During the work, the following research methods were used such as simulation of inflammatory and regenerative processes in the skin of white male rats at the introduction of suture material with subsequent histological, histochemical and immunohistochemical staining, photographing histological microphotographs. For statistical research, two basic parameters were chosen for each sign - the frequency with which the sign occurs in the group, and the intensity of manifestations of this trait. The frequency index of the sign was expressed as the percentage of animals in which the sign was detected, compared with the total number of animals in the group. The intensity index was reflected in the form $M \pm m$, where M is the mean value of the sum of the pluses calculated only in the animals in which this indicator is available, m is the mean square error from M . To compare the validity of the difference between the groups in terms of the frequency of manifestations of the trait, Pearson Criteria (2, Pearson's chi-squared). In order to compare the reliability of the indicator of the intensity of manifestations of the features among the groups, U-criteria Man-Whitney was chosen. The level of reliability is set at $p < 0.05$. For statistical analysis, the software InVivoStat v.3.0 and SofaStat v.1.4.6 were used. Libre Office Calc v.5.2.2.2 and Microsoft Office Excel 2007 spreadsheets were used to create the database, calculate the data obtained and graphically present the results. Experimental animals of a total of 310 individuals were divided into 5 groups of 60 individuals, depending on the type of implant. The rats of all groups (14, 30, 90, 180, 365 and 540 days) were divided into 6 subgroups of 10 individuals. All 10 rats of each subgroup were implanted with the same type of suture material. The Aptos implants were used for work, namely: Excellence Visage (EV), Nano Spring (NS), Aptos Spring (AS), Light Lift Thread (LLT) and Light Lift Spring (LLS). The examination of the normal skin and after introduction of implants of different structures and chemical composition was carried out using general histological, histochemical and immunohistochemical methods. It is shown positive effect on implant implantation on morphofunctional features of the skin. In dyslization of morphological changes in the perimplant zone, it was found that in all groups of experimental rats at different chronological stages formed collagen with different term of biodegradation and in different quantities. It has been established that depending on the use of different types of implantation thread (chemical composition and structure), collagenogenesis is stimulated unevenly. Thus, the experiment has shown that the intensity of collagen formation is largely influenced by the degree of tissue trauma associated with the relief and the shape of the thread, as well as the presence of polylactic acid. On the 540th day of the experiment, none of the resorbing threads degraded completely, which falls within the scope of information provided by the manufacturer about the time of degradation at least 365 days, and the feasibility of using these cosmetic threads in aesthetic dermatology for the purpose of prolonged lifting skin correction. Specificity of the structure of implant threads, namely the shape of the spring (NS, AS, LLS), as a provocative factor for long-term alteration, causes long-term inflammatory response in tissues (including 90th day of the experiment). When studying the qualitative composition of collagen, it was established that 1 type was formed in all groups of subjects, but in different quantity. After implantation of EV thread 100% collagen type I was formed. All other threads also stimulate the formation of collagen type I, but the ratio of it to collagen type 3 varies

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Поспішіль Юрій Олексійович
2. Pospishil Yurii

Кваліфікація: д.мед.н., 14.03.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Губіна-Вакулік Галина Іванівна
2. Губіна-Вакулік Галина Іванівна

Кваліфікація: д.мед.н., 14.03.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гичка Сергій Григорович

2. Гичка Сергій Григорович

Кваліфікація: д.мед.н., 14.03.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Сорокіна Ірина Вікторівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Сорокіна Ірина Вікторівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.