

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0415U001919

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-04-2015

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сідашенко Ольга Ігорівна

2. Sidashenko Olga Igorevna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 03.00.07

Назва наукової спеціальності: Мікробіологія

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 22-04-2015

Спеціальність за освітою: 7.04010202

Місце роботи здобувача: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Код за ЄДРПОУ: 02066747

Місцезнаходження: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна 72

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.233.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417087

Місцезнаходження: вул. академіка Заболотного, 154, м. Київ, Київська обл., 03143, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Код за ЄДРПОУ: 02066747

Місцезнаходження: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна 72

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 34.27.23

Тема дисертації:

1. Біологічні закономірності формування біоплівки штамми *Staphylococcus epidermidis*
2. Biological mechanisms of biofilm formation of *Staphylococcus epidermidis* strains

Реферат:

1. Дисертаційна робота присвячена вивченню біологічних закономірностей формування біоплівки за різних умов культивування штамми *S. epidermidis* та їх впливу на особливості розвитку експериментальних дисбактеріозів. Встановлено відмінності у прояві факторів патогенності у біоплівкоутворюючих порівняно з неформуючими у лабораторних умовах біоплівку штамми *S. epidermidis*. Гемолітичну та ліпазну активності проявляли всі біоплівкоутворюючі штами, а лецитиназну – 80%. Серед неформуючих біоплівку штамів, гемолітичну та ліпазну активності виявляли 89%, а лецииназну – 80%. Всі біоплівкоутворюючі штами високоадгезивні – ІАМ 9,75, а неформуючі у лабораторних умовах біоплівку штами переважно середньо- та низькоадгезивні – ІАМ 3,20. Досліджено динаміку формування біоплівки штамми *S. epidermidis*. Показано, що на 5 добу за стаціонарних умов культивування, спостерігали зменшення кількості життєздатних клітин біоплівки у 60 млн. разів, порівняно з показниками росту біоплівки, що формувалася за заміни поживного

середовища. Встановлено, що формування біоплівки відбувалося у діапазоні рН 5,0-8,0, при цьому максимальне збільшення досліджуваних показників росту відмічено при рН 7,0 - кількість клітин становила $(2,1 \pm 0,13) \cdot 10^9$ клітин/мл, індекс біоплівкоутворення - 5,6. За різних концентрацій моно- та дисахаридів, найбільшу кількість клітин у біоплівках та індекс біоплівкоутворення спостерігали при вмісті глюкози у поживному середовищі 2,0%. Внесення до добової біоплівки фторхінолонів у концентрації 10 та 50 МПК призводило до пригнічення її росту, а 100 МПК - до її деградації. Під час внесення до добової біоплівки 100 МПК офлоксацину, кількість життєздатних клітин знижувалася більше, ніж у 42 тис. разів порівняно з контролем. Вперше досліджено розвиток експериментального дисбактеріозу, чинником якого був біоплівкоутворюючий штам *S. epidermidis*, що характеризувався різким зниженням анаеробних лактобацил - у 165 та мікроаерофільних - у 16,5 разів, на фоні вираженого підвищення вмісту стафілококів - у 40 тис. разів порівняно з контролем на 10 добу спостереження. Ключові слова: біоплівка, біоплівкоутворюючі та неформуєчі у лабораторних умовах біоплівку штами, біоплівкоутворення, *Staphylococcus epidermidis*.

2. The thesis is devoted to the study of biological mechanisms of biofilm formation of *S. epidermidis* strains under different culture conditions and their influence on the development of experimental features dysbacterioses. A comparative study of the manifestation of pathogenicity factors: hemolytic, lipase, leucylaminase activity and ability to adhere in film-forming and non-film-forming strains of *S. epidermidis*. Studying pathogenicity factors of the film-forming strains it was found that complete hemolysis and lipase activity shown was by all the film-forming strains of *S. epidermidis*, leucylaminase activity was observed in 80%. Among the non-film-forming strains complete hemolysis and lipase activity were observed in 89% and leucylaminase - 71%. Researched non-film-forming and film-forming strains of *S. epidermidis* showed the ability to adhere to buccal epithelial cells of humans. Found that all the film-forming strains of *S. epidermidis* were high level adhesion, the index of adhesion of microorganisms was equal to 9,75. It was found that among non-film-forming strains of *S. epidermidis* were low- (29,40%), medium- (52,90%) and high (17,60%) level adhesion. Index of adhesion non-film-forming strains of *S. epidermidis* is 3 times lower compared to the index of adhesion of the film-forming strains of human epithelial cells and was 3,2.

Increasing, the studied parameters of biofilm growth by replacing the culture medium occurred within 5 days and for stationary culture conditions - for 3 days. Observed reduction in the number of viable cells in 60000000 times of the biofilm on the 5th day for stationary culture conditions, compared with that of biofilm, formed by replacing the nutrient medium. Established, that biofilm formation occurred in the pH range 5,0-8,0, with maximum growth observed at pH 7,0. The maximum increase in the growth of the studied parameters were observed at pH 7,0 - number of cells was $2,1 \cdot 10^9$ cells / ml, the biofilm index (BI) - 5,6. On the 3 day of cultivation the number of cells in the biofilm of *S. epidermidis* by pH 5,0 was lower in 19000 times, BI lower in 3,5 times, for pH 6,0 - 512 times, BI - 1,3, for pH 8,0 - 100 times, BI - 1,4 compared to the number CFU/ml biofilms that formed in medium with pH 7,0. The best influence on biofilm formation of *S. epidermidis* was affected by content of 2,0% glucose in the culture medium- number of cells after 3 days of cultivation was $2,3 \cdot 10^{11}$ CFU/ml, which is 26 times higher than the number of cells in the control biofilm. The content of sucrose in the culture medium is higher than 1,0%, and galactose and lactose is higher than 0,5% - caused inhibition of biofilm formation. The most of biofilm-forming strains were susceptible of fluoroquinolones drugs, such as ofloxacin and levofloxacin. It is shown, that when adding fluoroquinolones to daily biofilm in the minimal inhibitory concentration (MIC) of 10 and 50 was inhibited the growing of biofilm, and 100 MIC - led to its degradation. Adding to daily biofilm 100 MIC of ofloxacin caused a decrease in cell number to 42000 time, compared with the control. For the first time was studied that the development of experimental models of dysbacteriosis, factor of which was biofilm-forming strain of *S. epidermidis*, that characterized by a decrease in anaerobic lactobacilli - 165 and microaerophilic - 16,5 times, against the backdrop of a pronounced increase in the content of staphylococci - 40000 time, while related aerobes: anaerobes was 1: 98. Whereas, in dysbacteriosis, caused by non-film-forming strain of *S. epidermidis*, was reduction of anaerobic lactobacilli - in 2,0 time and microaerophilic one in 1,8 times, increasing the content of staphylococci in 6,9 times, while related aerobes: anaerobes was 1: 67. Key words: biofilm, biofilm-forming and non-film-forming strains, biofilm formation, *Staphylococcus epidermidis*

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вінніков Альберт Іванович

2. Vinnikov Albert Ivanovich

Кваліфікація: д.б.н., 03.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Курдиш Іван Кирилович

2. Курдиш Іван Кирилович

Кваліфікація: д.б.н., 03.00.07, 03.00.20

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сергійчук Тетяна Михайлівна

2. Сергійчук Тетяна Михайлівна

Кваліфікація: к.б.н., 03.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Підгорський Валентин Степанович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Підгорський Валентин Степанович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.

