Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0407U001276

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-03-2007

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Когут Віктор Вікторович
2. Kogut Viktor Viktorovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 14.01.06

Назва наукової спеціальності: Урологія

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-03-2007

Спеціальність за освітою: 7.110101

Місце роботи здобувача: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Код за ЄДРПОУ: 01896702

Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.615.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Код за ЄДРПОУ: 01896702

Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 76.29.43

Тема дисертації:

1. Корекція гіпоцитратурії та гіперурикозурії в комплексній профілактиці повторного каменеутворення у хворих на щавлевокислий нефролітіаз

2. The hypocitraturia and hyperuricosuria correction at complex prophylactic of recurrent renal stone formation at people with hyperoxaluric nephrolithiasis.

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена удосконаленню метафілактики щавлевокислого нефролітіазу, який є найбільш розповсюдженим видом СКХ. Характерна риса нефролітіазу будь якого виду - великий відсоток рецидивного каменеутворення, особливо у ранній період після звільнення ВСШ від каменів. В зв'язку з цим була поставлена мета підвищити ефективність метафілактичного лікування хворих на щавлевокислий нефролітіаз з використанням цитратних препаратів, урахуванням стану факторів ризику та методу звільнення сечових шляхів від каменя, що дозволило суттєво знизити відсоток рецидивів нефролітіазу.Обстежено 206 хворих на різні види нефролітіазу. Метафілактичні заходи були застосовані в групі щавлевокислого нефролітіазу, яка склала 138 хворих, у 106 з них - з використанням цитратних препаратів. Досліджені фактори ризику нефролітіазу, серед яких основними є гіпоцитратурія, гіперурикозурія, гіпероксалурія, сталі показники pH

сечі та низький показник добового діурезу. Встановлено, що екскреція цитрату сечі, незалежно від методузвільнення ВСШ від каменів, достовірно зростає під час отримання хворими цитратного препарату. При цьому, динаміка зниження екскреції цитрату сечі після відміни цитратного препарату не залежить від тривалості курсу цитратної терапії. Встановлені мінімальні терміни застосування цитратних препаратів в схемі метафілактичного лікування щавлевокислого нефролітіазу в залежності від методу звільнення ВСШ від конкрементів. Так, при самостійному відходженні каменя цей термін складає не менш ніж 2 місяці, а при інших методах усунення обструкції каменем - не менш ніж 6 місяців. Враховуючи найбільший ризик рецидивів каменеутворення на першому році після звільнення ВСШ від каменів, цитратну терапію треба проводити до 12 місяців з моменту усунення обструкції. На основі результатів власних клінічних досліджень науково обґрунтовано схему метафілактики щавлевокислого нефролітіазу з призначенням цитратів не постійно, а десятиденними циклами з наступними десятиденними перервами, що гарантує усунення гіпоцитратурії та зменшенняризикурецидивного каменеутворення. Застосування цитратної терапії в комплексі метафілактичних заходів дозволило знизити частоту рецидивного каменеутворення до 1,9%, у порівнянні з 9,4% в контрольній групі, де застосовувалися традиційні методи метафілактики нефролітіазу.

2. The work is dedicated to perfection of methaphilactic of hyperoxaluric nephrolithiasis, which is the most prevailing type of urolithiasis. Approximately 70 - 85 per cent of kidney stone is salt of oxalic acid. The characteristic feature of any type of nephrolithiasis is a very high percentage of recurrent stone formation, especially in early period after release of superior urinary tract from stones. As a result the aim of our work was to increase effectiveness of methaphilactic treatment of patients with hyperoxaluric nephrolithiasis by using citrate preparations, taking into consideration risk factors and methods of extraction of stones from urinary tract, which allowed to reduce essentially the percentage of recurrent nephrolithiasis. It was examined 206 patients with different types of nephrolithiasis. Metaphilactic methods were used in group with hyperoxaluric nephrolithiasis, which was consisted of 138 patients; in 106 patients citrate preparations were used. It was investigated risk factors ofnephrolithiasis: pH of urine, hypocitraturia, hyperuricosuria, hyperoxaluria, diurnal diuresis. It was established that excretion of citrate of urine arises for certain during treatment with citrate preparations independently of method of extraction of stones from urinary track. Moreover the dynamics of reducing of urine citrate after cessation of citrate therapy is independent of duration of citrate therapy. It was established the minimal period of usage of citrate preparations in plan of methaphilactic treatment of hyperoxaluric nephrolithiasis dependently on method of extraction of stones from urinary track. So, if the stone came out without any assistance, this period would be no less then 2 months, but other methods of removing stone obstruction could prolong this period till 6 months. Taking into consideration, that risk of recurrent stone formation is the highest during first year after removing stones from superior urinary track, in this case it is necessary to do citrate therapy during 12 months fromthe moment of removing stone. According to results of personal clinical investigations the scheme of methaphilactic of hyperoxaluric nephrolithiasis was scientifically founded by instituting citrates not constantly, but cyclically (10 days of therapy, 10 days of rest), which is guarantee disappearance of hypocitraturia and reduction of risk of recurrent stone formation. Usage of citrate therapy in complex methaphilactic measures allowed to reduce recurrent stone formation in 1,9%, in compression with 9,4% in control group, where only traditional methods of methaphilactic were used.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дзюрак Валерій Семенович

2. Dzyurak Valerij Semenovych

Кваліфікація: д.мед.н., 14.01.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гузенко Валерій Миколайович

2. Гузенко Валерій Миколайович

Кваліфікація: д.мед.н., 14.01.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пепенін Володимир Розумнікович

2. Пепенін Володимир Розумнікович

Кваліфікація: д.мед.н., 14.01.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради — Сеймівський Данило Антонович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні — Сеймівський Данило Антонович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності — Юрченко Т.А.